

Befund Erwachsene

Name, Vorname:		Geburtsdatum:	
Datum:	Therapeutin:		
Diagnose(n):		EDSS-Skala:	
Relevante Nebendiagnose(n):			

Anamnese

Subjektives Hauptproblem, Persönliche Ziele, evtl. Ziele Bezugspersonen, Beruf/Hobby, Kooperationsbereitschaft und Vorerfahrung mit Pferden, Selbstversorgung (d 5), Umweltfaktoren

Allgemeines, spontanes Bewegungsverhalten

Spontansitz in Ruhe/freier Sitz (d 415), Transfer Sitz/Sitz (2 Stühle rechtwinklig zueinander) (d 410), Sitz-Stand-Übergang, Stand, Gehstrecke (d 4500 < 1km), (d 4501 > 1km), (d 4502), Hilfsmittel, **Gangbild** (von hinten/von der Seite), Treppensteigen (d 451), **Stützfunktion (b 763) obere Extremität/Greiffunktion Hand (d 440)**

Sensomotorik

Tonus (b 735), Klonus, erschöpflich (< 10 Sek), unerschöpflich (>10 Sek), Tonusverhältnisse, Auswirkung auf den Sitz auf dem Stuhl, Mögliche Auswirkung auf den Sitz auf dem stehenden Pferd

Sensibilität/Wahrnehmung (b270)


vermindert, erhöht, verändert

Ataxie - Koordinationsfähigkeit (b760)

rasche, rhythmisch-alternierende Bewegungen: Knie-Hake, Dysdiadochinese, Taktschläger, Trommel

Passive Beweglichkeit (b 710)

Hüftgelenke (F/E, ABD, Rot), LWS (LF, F/E), thoracolumbalen Übergang (Rot BK), BWS (LF, F, E)
normal, vermindert, genügend, ungenügend



Selektive Kraft (b730) *

HG (b7301) F/E, ADD/ABD, Türmchen nach ventral/dorsal, LF

Sitzverhalten

Sitzverhalten (Stufe 1)		auch assistiv nicht möglich	assistiv möglich	ohne Hilfe möglich
Einordnung in die vertikale KLA des KA Becken				
des KA Brustkorb				
des KA Kopf				
Sitzverhalten (Stufe 2-4) Test nur sinnvoll, wenn selektive Armbewegungen möglich sind	mit Fixation am Becken nicht mögl.	mit Fixation am Becken möglich	ohne Hilfe möglich	
Beschleunigte Armbewegungen				
Sagittal				
Frontal				
Transversal				

Bemerkungen:


Selektivität innerhalb der stabilisierten Körperlängsachse (Stufe 2-4)

Ausgangsstellung Hochsitz mit Fussbodenkontakt

Sagittale Translation des Brustkorbs zum Becken	assistiv möglich	ohne Hilfe möglich
vom BK her nach dorsal		
dabei Kontrolle der BE-stellung durch Therapeut		

Frontales Becken-Mobile auf Sissel: symmetrisch asymmetrisch

Bemerkungen:



Zusammenfassung:

Hauptprobleme, Folgestörungen, Relevante Nebenstörungen, Problemanalyse (Struktur-, Aktivitäts- und Partizipationsebene im Zusammenhang erfassen)

Ziele der Hippotherapie-K®:

Formuliert nach SMART auf Aktivitäts- und Partizipationsebene

Globalziel:

Lokalziele:

-
-
-

Allfällige zusätzliche, relevante Assessments:

Geplantes Vorgehen / Massnahmen:

Vorstufe - Übungsstufe 1:

Übungsstufe 2 -4:

Behandlungsebene (frontal, sagittal, transversal):

Wahl des Pferdes:

Hilfsmittel:

Auf-absteigen:

Bemerkungen: