



Evaluation pour adulte

Nom, Prénom:		Date de naissance:	
Date:	Thérapeute:		
Diagnostic:		Echelle-EDSS:	
Diagnostic secondaire à relever:		Médicament :	

Anamnèse

Problème subjectif, objectif personnel, evtl. objectif de la personne référente, métier/hobby, coopération et expérience avec les chevaux, entretien personnel (d 5), facteurs environnementaux (e)

Comportement spontané des mouvements

Position assise spontanée/sans appui (d 415), Transfert chaise/chaise (2 chaises perpendiculaires) (d 410), Transfert assis-debout, position debout, Périmètre de marche (d 4500 < 1km), (d 4501 > 1km), (d 4502), moyens auxiliaires, analyse de marche (de derrière/de côté), escaliers (d 451), appui membre supérieur (b 763) / motricité fine (d 440)

Sensorimoteur

Tonus (b 735), Clonus, épuisable (< 10 sec), inépuisable (>10 sec), état de tonus, répercussion dans la position assise, possible répercussion sur le cheval immobile

Sensibilité/perception (b270)

Diminuée ou altérée

Ataxie - capacité de coordination (b760)

Ataxie des extrémités : mouvements rapides, rythmés et alternés : genou-talon, Dysdiadochinese, métronôme, timballe latérale
Ataxie du tronc voir sous position assise/contrefort

Mobilité passive (b 710)

Hanches (F/E, ABD, Rot), rachis lombaire (IL, F/E), rachis lombo-thoracique (Rot CT), rachis thoracique (LF, F, E)
Normal, diminué, suffisant, insuffisant



Force sélective (b730) *

Hanche (b7301) F/E, ADD/ABD, la tour en ventral/dorsal, inclinaison latérale

Comportement assis (Phase 1)

Alignement de l'ALC à la verticale	Même pas possible assisté	Possible assisté	Possible sans aide
Du segment bassin			
Du segment cage thoracique			
Du segment tête			

Remarques :

Contrefort en position assise Phase 2-4

Mouvements accélérés des membres supérieurs Seulement à tester si les mouvements sélectifs des membres supérieurs sont possibles	Pas possible avec fixation au bassin	Possible avec fixation au bassin	Possible sans aide
Sagittal			
Frontal			
Transversal			

Remarques:

Sélectivité dans l'ALC stabilisé (phase 2-4)


Siège haut, les pieds sont en contact avec le sol

Translation sagittale de la cage thoracique vers le bassin	Possible assisté	Possible sans aide
CT en dorsal		
Contrôle du bassin par la thérapeute		

Bassin-Mobile frontal sur le Sissel: symétrique asymétrique

Remarques:

* Selon l'échelle modifiée de Regula Steinlin Egli, page 79, MS verstehen und behandeln, Edition Springer, 2011



Résumé:

Problèmes principaux, conséquences, d'autres problèmes pertinents, analyse (saisir la relation entre les plans de la structure, activité et participation)

Objectifs de l'Hippotherapie-K®:

Formulé selon SMART sur les plans de l'activité et la participation

Objectif global:

Objectifs locaux:

-
-
-

Evaluation/Assessment:

Plan d'intervention / mesures prévues:

Phase préparatoire - phase 1:

Phases 2 -4:

Sur les plans (frontal, sagittal, transversal):

Choix du cheval:

Moyens auxiliaires:

Monter/descendre du cheval:

Remarques: